

# FELV e FIV

## O que é a Leucemia dos gatos (FeLV) ?

É causada por um vírus que pode induzir uma depressão do sistema imunitário, anemia e/ou linfoma, e afeta gatos em todo o mundo. A prevalência na Europa é baixa (<1%), mas pode exceder os 20 % em certas regiões.

O vírus não sobrevive por muito tempo fora do hospedeiro e é facilmente destruído por desinfetantes, sabão, aquecimento e secagem. No entanto, pode sobreviver nas fezes, permanece viável se mantido húmido a temperatura ambiente ou em sangue para transfusões.

## Como é transmissível a infeção?

A transmissão do FeLV ocorre através da saliva, fezes, secreções nasais e leite dos gatos infetados, por contato amigáveis (cuidados de higiene) entre outros, mas também através de mordeduras.

## Quais são os sinais clínicos?

Os sinais clínicos comuns são: anemia, imunossupressão (com predisposição para infeções) e linfoma. Outros sinais menos comuns incluem: doença imunomediada, enterite crónica, perturbações reprodutivas e neuropatias periféricas.

A maior parte dos gatos com virémia persistente morrem dentro de dois ou três anos após o diagnóstico.

## Quais as recomendações da vacinação?

Os gatos em que desconheça o estado relativo ao FeLV deverão ser testados antes da vacinação.

A vacina contra o FeLV não faz parte do grupo das vacinas de base (core), contudo todos os gatos saudáveis com risco potencialmente de exposição (casa com vários gatos, acesso ao exterior, área de FeLV endémica) deverão ser vacinados contra o FeLV.

## O que é a Imunodeficiência Felina (FIV)?

É causada pelo vírus da imunodeficiência felina (FIV). A maior parte dos felídeos são susceptíveis ao FIV, mas o Homem não. Este vírus é endémico nas populações de gatos domésticos e todo o mundo, variando entre regiões. Fora do hospedeiro o FIV perde rapidamente a capacidade de infetar sendo susceptível a todos os desinfetantes incluindo o sabão comum.

## Como é transmissível a infeção?

A maior parte das infeções por FIV são originadas por mordeduras (lutas, acasalamento) de gatos infetados, por isso gatos de rua que não estejam castrados e esterilizados são o mais afetados pela doença.

## Quais são os sinais clínicos?

A infeção pelo FIV tem uma fase latente ou “assintomática” longa e a maior parte dos sintomas são secundários á imunodeficiência que o vírus causa no organismo, sendo as manifestações mais típicas: gengivite e estomatite crónica, perda de peso, insuficiência renal associada e glomerulonefrite imunomediada.

## Quais as recomendações da vacinação?

No momento não existe nenhuma vacina para FIV disponível comercialmente na Europa.

	FeLV	FIV
<b>Principal via de contágio</b>	Lambeduras (grooming)	Mordeduras (lutas)
<b>Prognóstico</b>	Grave	Reservado
<b>Resistência do vírus no meio ambiente</b>	Baixa	Muito baixa
<b>Risco para gatos coabitantes</b>	Elevado	Moderado
<b>Risco de contágio para o homem e outros animais</b>	Nulo	Nulo
<b>Vacina disponível</b>	Sim	Não em Portugal